

Sexuell dysfunktion hos förstföderskor

Författare: Hedda Dahlgren¹, MD; Markus H Jansson^{1,2}, MD; Karin Franzén^{1,2}, MD, PhD; Ayako Hiyoshi², PhD; Kerstin Nilsson², MD, PhD

¹Kvinnokliniken, Region Örebro län

²Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Jävsförhållanden: inget att deklarerera

Syfte och metod

- Att studera sociodemografiska-, graviditets- och obstetriska faktorerers påverkan på sexuell funktion, 12 mån postpartum
- 958 förstföderskor i Örebro, år 2014-2017, enkätstudie
- Vad mättes?
 - Sexuell aktivitet
 - Sexuell funktion
 - PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire)

Resultat i sammanfattning

Sexuellt aktiv	
Tidig graviditet	98%
12 mån postpartum	90%

Sexuellt inaktiv 12 mån postpartum
Riskfaktor
Perinealbristning grad ≥ 2
Pågående amning

Minskad sexuell funktion 12 mån postpartum
Riskfaktor
Dålig självskattad hälsa i tidig graviditet
Ålder >25 år

Slutsats

- De flesta kvinnor var sexuellt aktiva 12 mån postpartum
- Liten minskning i sexuell funktion mätt med PISQ-12
- Få riskfaktorer för minskad sexuell funktion