SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK & GYNEKOLOGI
Swedish Society of Obstetrics and Gynecology

Godkänt av SFOG:s styrelse 2026-10-01

SFOG-Råd Kvalitetsuppföljning av anatomigranskning

Författare:
Mårten Ageheim, Jesper Agrell för Ultra-ARG, obstetrik

Författarna har inga jäv att deklarera, aktuell jävsdeklaration finns att tillgå via SFOG:s kansli

Nedanstående målvärden beslutades vid Ultra-ARG obstetrik – mötet den 12 maj 2026. Nivån på målvärden kommer att diskuteras med regelbundna intervall och justeras vid behov.

Den uppdaterade listan över diagnoser för uppföljning av prenatal detektionsgrad syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för kvalitetsarbete inom fosterdiagnostik. Idag saknas system för nationell uppföljning varför det finns en stor osäkerhet kring detektionsgrader. Tills detta finns på plats kan resultaten följas lokalt och regionalt.

Diagnoserna på listan är valda utifrån tre kriterier: att de ska vara möjliga att upptäcka vid ultraljud i graviditetsvecka 18-20, vara tydligt definierade, och vara kliniskt uppenbara under den tidiga postnatala perioden. De angivna målvärdena för antenatal detektion är inte tänkta att ses som krav, utan teoretiskt uppnåeliga. Både målvärden och diagnosurval kan komma att revideras.

Avvikelse	Mål:
Anencefali	100%
Encefalocele	90%
Ej hudtäckt ryggmärgsbråck	90%
Läppspalt*	75%
Enkammarhjärta	95%
AVSD[1]	80%
Överridande artär/Fallots anomali	90%
TGA[2]	90%
Coarctatio aortae	40%
Diafragmabråck**	70%
Gastroschis	95%
Omfalocele	95%
PEVA[3]	75%

* Inkluderar läpp-käkspalt och läpp-käk-gomspalt, men inte isolerad gomspalt

** Fall som enbart är postnatalt diagnosticerade inkluderas endast om diagnos satts den första levnadsmånaden

[1]Atrioventrikulär septumdefekt, [2]Transposition av de stora artärerna, [3]Pes Equino Varus Adductus (tidigare kallad klumpfot)